OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

72,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY

TRENTE-CINQUIÈME FASCICULE

(10 février 1922)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

254

MOULINS
" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "
15, RUE D'ENGHIEN, 15

1922

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

Nouveautés diverses[1]

Chelonarium scutellare n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, fere glaber, rufescens, elytris pro parte obscurioribus, scutello luteo pubescente; thorace in disco fere læve, antice sparse punctato et arcuate impresso; elytris minute et sparse punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *gyrinoides* Chev., moins foncé, prothorax différent et écusson pubescent.

C. testaceitarsis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, sparse pubescens, plus minusve rufescens, tarsis testaceis. Long. 5-6 mill. Brésil. — Voisin du précédent, en diffère par le prothorax régulièrement arqué en avant, l'écusson presque glabre, la coloration moins foncée des élytres, etc.

Cis discoidalis n. sp. Angustatus, parum nitidus, breve et sparse pubescens, nigro-metallicus, elytris in disco rufo vittatis, antennis ad basin pedibusque testaceis. Long. 3 mill. Cameroun. — Espèce très distincte par son système de coloration.

C. punctatissimus v. nov. distanticornis. Les cornes du ♂ sont petites et éloignées l'une de l'autre au prothorax et sur la tête. Madagascar.

C. nigrofasciatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, pallido-testaceus, elytris ad basin et ante apicem nigro

(1) Comme dans les précédents fascicules, je désigne seulement, par la première lettre du genre, les espèces, du même genre, qui suivent celle décrite la première. Toutes les nouveautés décrites ici figurent au moins dans la collection Pic.

maculatis, post medium nigro fasciatis. Long. 2,5 mill. Guadeloupe. — Voisin de *atromaculatus* Pic, distinct, à première vue, par les élytres fasciés postérieurement.

C. testaceofasciatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace plus minusve elytrisque apice rufis, his ad medium testaceo fasciatis, capite membrisque testaceis. Long. 2 mill. Guadeloupe. — Voisin du précédent.

Le **C. infasciatus** mihi, de la Guadeloupe, est très voisin du précédent, mais il est roussâtre, avec les élytres plus ou moins obscurcis, mais non fasciés.

C. aureopubens n. sp. Oblongus, rufus, sparse aureo pubescens, fortiter sat dense punctatus; capite piceo, antice in mare breve bicornuto. Long. 3,5 mill. Guadeloupe. — A placer près de *puberulus* Mellié.

C. obscuripennis n. sp. Oblongus, opacus, rufus, elytris piceis, nitidis, breve sat regulariter hirsutis, pro parte lineato punctatis; capite antice ♂ minute bicornuto; thorace parum breve et lato, dense punctato. Long. 2,5 mill. Guadeloupe. — Peut se placer près de *Melliei* Coq.

C. Dufaui n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, rufus aut testaceus, elytris postice piceis; thorace satis elongato, minute punctato; elytris parum et irregulariter punctatis; capite antice in mare breve bidentato. Long. 3 mill. Guadeloupe.

Cerasis ater n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, sat fortiter et irregulariter punctatus, niger, antennis ad basin pedibusque rufis; thorace antice in mare et capite breve bidentatis. Long. 2,5 mill. Guadeloupe. — Peut se placer près de *militaris* Mell.

Le **C. rufipes,** de la même origine, est plus étroit, moins fortement ponctué, avec le prothorax simple et bordé de roux en avant.

C. 4-dentatus n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, rufus, parum fortiter punctatus; thorace robusto; in mare thorace antice capiteque breve bidentatis. Long. 2,3 mill. Guadeloupe.

C. laticornis n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, diverse punctatus, testaceus; capite in mare longe et late bicornuto. Long. 3 mill. Guadeloupe. — Voisin de *bifurcus* Gorh., mais cornes subarrondies au sommet et prothorax un peu plus large que les élytres.

C. particularis n. sp. Oblongus, nitidus, sat fortiter punctatus, sparse griseo pubescens, piceus, membris testaceis; capite in mare bicornuto. Long. 2,3 mill. Guadeloupe. — Espèce très distincte par la structure particulière des cornes qui sont aplaties avec une petite dent sur le côté interne.

C. semipallidus n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, castaneus, elytris postice late membrisque pallidis; capite in mare lamellato-bifurcato. Long. 2 mill. Guadeloupe. — Voisin de *bifurcus* Gorh., coloration différente.

Macrosis rufescens n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter et sparse punctatus, fere glaber, rufescens; capite in mare longe bicornuto. Long. 3 mill. Guadeloupe. — A placer près de *testaceimembris* Pic.

Petalium cornutum n. sp. Oblongus, luteo-pubescens, niger; thorace antice angulato; elytris minute et irregulariter punctatis. La var. **ruficeps** a la tête et les pattes rousses. Long. 2 mill. Brésil. — Voisin de *tucumanense* Pic, plus robuste, plus foncé et saillie antérieure du prothorax plus forte et plus relevée.

P. tijucanum n. sp. Oblongus, luteo-pubescens, castaneus, membris testaceis; thorace antice paulo attenuato, subarcuato; elytris minute et irregulariter punctatis. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *Gorhami* Pic, de forme moins allongée, prothorax plus robuste, etc.

Le **P. inimpressum** mihi, du Brésil, de coloration roussâtre, se distingue du précédent par la pubescence plus rude, le prothorax moins large et nettement rétréci en avant.

P. impressum n. sp. Parum elongatus, aureo pubescens, castaneus, aliquot pro parte piceus; thorace antice late arcuato, in disco postice fortiter arcuate impresso, granulato-punctato; elytris pro parte striatis et diverse punctatis. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *impressithorax* Pic, plus allongé et prothorax non gibbeux sur le disque.

Lasioderma rufescens n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, rufus, abdomine membrisque testaceis; thorace breve, dense punctato; elytris elongatis, instriatis, minute punctatis. Long. 4,5 mill. Cameroun. —

Xyletinus longior n. sp. Elongatus, nitidus, pro parte sericeo pubescens, piceus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus; thorace breve, antice inflexo; elytris elongatis, minute striato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de *brasiliensis* Pic, plus foncé et plus allongé avec le prothorax incliné plus verticalement en avant.

X. robusticollis n. sp. Oblongus, nitidus, sericeo pubescens, rufo-testaceus; thorace breve, convexo, sparse punctato; elytris thorace non latioribus, pro parte et minute striatis, sparse punctatis. Long. 5 mill. République Argentine. — Voisin de *cylindricus* Sol., plus trapu, élytres moins striés, etc.

X. striatus n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus et mediocre pubescens, rufo-brunneus; thorace satis breve, antice attenuato; elytris thorace non latioribus, fortiter striatis. Long. 4 mill. Thibet. — Plus robuste que *angustatus* Pic., élytres fortement striés, prothorax différent, etc.

Thaptor multimaculatus n. sp. Oblongus, elongatus,

fere opacus, niger, luteo squamulatus et multi nigro-maculatus, membris rufis. Long. 3 mill. Brésil. — Espèce très distincte par ses multiples petites macules noires sur fond jaune. — A placer près de *tessellatus* Pic.

T. substriatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, pubescens, piceus, capite membrisque rufis; elytris lateraliter mediocre striatis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Diffère de *throscoides* Gorh., par la forme moins allongée et les stries latérales non complètement effacées antérieurement.

T. instriatus mihi, du Brésil, voisin du précédent et un peu plus petit avec les pattes plus foncées, en est très distinct par l'absence de toute strie latérale et la ponctuation plus nette des élytres.

T. punctatus n. sp. Oblongus, subopacus, sat fortiter et dense punctatus, sparse et parum dense pubescens, piceus, capite, abdomine membrisque rufis; elytris in disco pro parte et parum distincte substriatis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa ponctuation dense, jointe à sa pubescence espacée.

Microthaptor n. gen. Ovatus, convexus, grosse punctatus, sparse et rude pubescens; elytris instriatis. — Voisin du genre *Thaptor* Gorh., distinct, à première vue, par la forme du corps.

Microthaptor ovatus n. sp. Ovatus et latus, rufo-brunneus, parum nitidus, grosse et dense punctatus, sparse et luteo pubescens. Long. 2 mill. Brésil.

Ptilinus bahianus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, antennis piceis, ad basin rufis; thorace robusto, lateraliter subarcuato, antice tuberculato; elytris instriatis. Long. 5 mill. Brésil. — A placer près de *pectinicornis* L.

Le **P. angustatus** mihi, du Brésil, est rembruni, plus

petit, étroit et subparallèle, avec une pubescence plus rude, en partie disposée en rangées sur les élytres.

P. granulatus n. sp. Elongatus, subparallelus, punctato-granulatus, luteo pubescens, nitidus, nigro-piceus, abdomine membrisque rufis; thorace robusto; elytris lateraliter striatis. Long. 5 mill. Kap Plate. — Très distinct par sa ponctuation granuleuse.

Oligomerus Wagneri n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, articulis 2 primis antennarum, thorace antennis 11 articulatis, articulis tribus ultimis parum elongatis; thorace robusto, dense punctato; elytris thorace non latioribus, sat fortiter striato-punctatis. Long. 5 mill. Rép. Argentine. — Ressemble à *Reyi* Bris., antennes à derniers articles moins longs, pubescence soulevée, etc.

Xylobanus indicus n. sp. Angustatus, niger, thorace, illo in disco minute nigro-notato, scutello elytrisque rubris; antennis depressis; thorace parum elongato, 7 areolato; elytris thorace paulo latioribus, fortiter punctatis. Long. 9 mill. Indes. — Plus allongé que *nigrimembris* Pic, antennes et ponctuation différentes.

Stadenus atripes n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, articulis 2 primis antennarum, thorace, scutello et elytris ad basin late testaceis. Long. 10 mill. Natal. — Voisin de *ruficeps* Brg., en diffère par les pattes antérieures toutes noires, l'écusson moins étroit, impressionné au milieu, etc.

S. parallelus n. sp. Angustatus, niger, antennis ad basin, capite, thorace, scutello, pectore femoribusque ex parte testaceis, elytris testaceis, apice late nigris. Long. 13 mill. Congo. — Voisin de *ruficeps* Brg., distinct, à première vue, par sa forme étroite et sa poitrine testacée.

S. Auberti v. nov. geniculatus. Thorace testaceo, in

disco nigro notato, antennis ad basin et apice rufo testaceis, pedibus nigris, tibiis ad basin rufis. Fort Crampel.

Cautires atricollis n. sp. Satis latus, niger, thorace lato, lateraliter vage testaceo, elytris ochraceis, postice late nigris; capite antice et articulo ultimo antennarum testaceis, his satis validis. Long. 10 mill. Congo. — A placer près de *ocularis* Brg.

C. lyciformis n. sp. Latus, postice dilatatus, niger, antennis ad basin, thorace, illo postice nigro binotato, scutello, pedibus anticis pro parte elytrisque ad basin late ochraceis. Long. 11 mill. Afrique orientale. — Espèce à faciès de *Lycus* F.

Le **binotatus** mihi, de la même origine et de coloration analogue, a les antennes et la tête noires, la forme plus étroite, le prothorax non transversal, presque droit sur les côtés.

C. lateniger n. sp. Elongatus, niger, thorace, illo postice nigro notato, elytrisque ad basin breve testaceis. Long. 9 mill. Tanganika. — A placer près de *sulcicollis* Thoms., très distinct par sa coloration.

Leptura fokienensis n. sp. Parum elongatus, fere opacus, niger. Long. 18 mill. Chine. — Très voisin de *Bangi* Pic, mais prothorax plus large, globuleux, élytres moins densément ponctués, obliquement tronqués au sommet avec l'angle externe saillant.

Demonax lineatus v. nov. longeprolongatus. Cette variété offre au prothorax trois bandes longitudinales noires, flanquées d'une petite macule latérale noire et aux élytres une double bande antérieure en forme de V, une bande médiane remontant sur la suture, une macule antéapicale, flanquée d'un trait externe, celles-ci noires sur fond jaune. Tonkin. (Coll. Clermont et Pic.)

Xylotrechus signaticollis n. sp. Parum elongatus, niger, multi et diverse luteo fasciatis, membris testaceis, femoribus late nigris. — Cette espèce a la tête unicarénée, jaune et noire, le prothorax plus long que large, rétréci aux extrémités, noir, bordé de jaune, avec, de chaque côté, une fascie postérieure arquée et des macules antérieures jaunes, l'écusson jaune, les élytres noirs, ornés des dessins jaunes suivants: une macule préscutellaire, une linéole humérale, une fascie antérieure sinuée, une sorte d'anneau postérieur et une macule apicale, le dessous en partie noir, en partie jaune. Long. 14 à 15 mill. Tonkin (coll. Clermont et Pic). — Peut se placer près de *Gestroi* Gah. le prothorax est moins robuste et les dessins des élytres sont différents.

Polyzonus testaceipennis n. sp. Angustatus, cyaneo-violaceus, nitidus, elytris testaceis, subopacis, apice attenuatis; thorace lateraliter late tuberculato, non dentato. Long. 17 mill. Chine. — Espèce très distincte par son système de coloration; peut se placer près de *obtusus* Bates.

Phytoecia atripes n. sp. Angustatus, nitidus, parum dense griseo pubescens, niger, elytris subæneis; thorace satis breve, fortiter punctato, vage griseo trilineato; elytris elongatis, parallelis, sat fortiter punctatis, apice rotundatis. Long. 12-14 mill. Chine. — Peut se placer près de *asiatica* Pic.

Trochoideus particularis n. sp. Parum elongatus, castaneus, capite antice, membris, elytris ad humeros et apice rufis; articulo ultimo antennarum arcuato, parum crasso; thorace transverso, lateraliter antice arcuato; elytris thorace paulo latioribus, distincte punctatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Espèce voisine de *Desjardinsi* Guer. et caractérisée par le 4e article des antennes peu arqué.

T. Rouyeri n. sp. Parum elongatus, testaceus, thorace in disco castaneo, elytris castaneis, testaceo cinc-

tis; articulo 4 antennarum valido. Long. 4 mill. Java. — A placer près de *Desjardinsi* Guer., dont il n'est peut-être qu'une variété de coloration.

Danae atronotata n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, antennis apice thoraceque in disco nigris, elytris testaceis, in disco late et abbreviate nigro vittatis. Long. 4 mill. Cambodge. — Espèce distincte, à première vue, par son système de coloration.

Stenotarsus argentinus n. sp. Subovatus, convexus, hispidus, testaceus, articulis sex ultimis antennarum nigris; antennis apice dilatatis; thorace breve, antice attenuato, lateraliter valde deplanato; elytris thorace paulo latioribus, irregulariter punctatis. Long. 4 mill. Rép. Argentine. — Peut se placer près de *ictericus* Gerst.

S. Favareli n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, luteo-hirsutus, testaceus; thorace breve, minute punctato; elytris thorace paulo latioribus, minute, irregulariter et sparse punctatis. Long. 4 mill. Gabon. — Voisin de *æquatus* Gorh. et distinct, à première vue, par les antennes concolores.

Mycetina atricollis n. sp. Subovatus, nitidus, luteo-hirsutus, elytris, scutello, geniculis et abdomine pro parte rufis; thorace breve, transverso, fere lævе; elytris thorace paulo latioribus, minute et sparse punctatis, humeris prominulis. Long. 4 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *compata* Frm., très distinct par sa coloration.

Lithophilus diversicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-piceus, capite antice, membrisque rufis, elytris nigro-piceis minute rufo cinctis (*forma typica*), aliquot concolor, rufo-testaceus (v. nov. erythreus). Long. 3 mill. Erythrée. — Ressemble à *araxis* Reitt., très distinct par le prothorax à peine retréci postérieurement, faiblement et étroitement rebordé.

Cryptocephalus nigricolor n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin rufis; thorace fere impunctato; scutello elevato; elytris lineato-punctatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *sannio* Redt.

C. luteosignatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, diverse luteo notatus, antennis apice, scutello circa elytrisque nigris, his luteo 5 (2,2,1) maculatis et infra humeros luteo lineolatis. Long. 3,5 mill. Tonkin. — Voisin de *perelegans* Baly.

C. brevesignatus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, pro parte rufescens, antennis apice elytrisque nigris, his late ad medium et ante apicem luteo maculatis, ad basin breve luteo lineolatis; thorace impunctato, nigro bimaculato; elytris minute lineato-punctatis. Long. 3,5 mill. Yunnan (coll. Clermont et Pic).

C. Moutoni n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris nigris, ad medium et lateraliter late testaceo maculatis, his fortiter striato-punctatis. Long. 3 mill. Shang-Haï. — Très distinct du précédent par la forte ponctuation des élytres, le prothorax immaculé, etc.

C. multicolor n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter et in disco luteo notato, elytris rubris, in disco testaceis et nigro notatis, disperse punctatis, pygidio nigro, testaceo maculato. Long. 4 mill. Shang-Haï. — Chez cette jolie espèce, voisine de *signaticeps* Baly, les élytres ont la base bordée de noir, le pourtour largement et le disque jaunes avec 2 macules antérieures rapprochées et une courte fascie postmédiane, celles-ci noires.

C. sinuatipennis n. sp. Satis elongatus, postice attenuatus, nitidus, testaceus; thorace robusto, sat fortiter punctato; elytris brevibus, postice attenuatis, antice impressis, fortiter lineato-punctatis, lateraliter sinuatis. Long. 4 mill. Fort Crampel. — Peut se placer près de *punctatissimus* Sufr.

C. atropygidialis n. sp. Oblongus, postice attenuatus, testaceus, antennis pro majore parte et infra corpore nigris. thorace postice, scutello elytrisque nigro-marginatis, his ad humeros nigro notatis. Long. 3,5 mill. Côte d'Ivoire. — Très distinct du précédent, en outre de la coloration, par les élytres plus réguliers, le prothorax plus court et plus fortement ponctué.

C. bisbirufonotatus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, niger, antennis ad basin, capite inter oculos, pedibus, thorace lateraliter late et elytris apice rufis; thorace parum punctato; elytris sparse et minute lineato-punctatis. Long. 4,5 mill. Abyssinie. — Ressemble à notre espèce paléarctique *crassus* Ol.

C. flavopygidialis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin, capite pro majore parte, thorace, pygidio abdomineque pro parte flavis, elytris nigro-cyaneis, lineato-punctatis. Long. 4 mill. Chine. — Peut se placer près de *petulans* W., en diffère par les élytres bleutés, le pygidium flave, etc.

C. irregularis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, elytris ad basin nigro marginatis; thorace læve; elytris fortiter et irregulariter punctatis, lateraliter bisulcatis et pro parte regulariter bilineato-punctatis. Long. 7 mill. Fort Crampel. — Voisin de *benuensis* Jac., par la ponctuation irrégulière des élytres, mais coloration plus claire, base de l'écusson et celle des élytres étroitement noire, etc.

C. multicoloratus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, thorace in disco rufo et nigro bimaculato, ad medium luteo lineato et lateraliter luteo maculato, elytris testaceis, ad basin et ad medium nigro fasciatis, fasciis lateraliter conjunctis. Long. 6 mill. Côte d'Ivoire. — Voisin de *C. luteolineatus* Pic, plus robuste avec les fascies jointes latéralement.

C. luteolineatus v. nov. breveluteonotatus. Thorace

rufo, ad medium luteo lineato et postice lateraliter breve luteo notato. Congo.

C. pangalanus n. sp. Coloration de la variété précédente avec le prothorax bimaculé de foncé, les élytres noirs à macule antémédiane et macule ante-apicale plus petite jaunes. Long. 4-5 mill. Congo.

C. subatrocinctus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, testaceus, capite postice uni, thorace sex (4,2) nigro maculatis, elytris testaceis, postice nigro cinctis, nigro 4 maculatis (1, 1, 2), sutura nigra. Long. 3 mill. Fort Crampel. — Voisin de *fortis* W., mais avec les élytres ayant seulement 4 macules noires (1re humérale, 2 présuturale médiane, 3, 4 après le milieu) et bordés, sauf sur les côtés antérieurs, de noir.

C. adonis n. sp. Oblongus, nitidus, viridi-metallicus, antennis ad basin tibiisque testaceis; thorace testaceo-marginato et ad basin luteo maculato, macula bilobata; elytris testaceis, viridi-cinctis et in disco antice metallico sinuato-vittatis. Long. 4 mill. Abyssinie. — Jolie petite espèce, à dessins particuliers, pouvant se placer près de *specularis* Suf.

C. Caroli n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, infra corpore pedibusque pro parte nigris, elytris ad humeros breve nigro maculatis; thorace fere impunctato; elytris minute lineato-punctatis. Long. 4 mill. Kilimandjaro. — Voisin de *clypeatus* Suf., coloration plus rousse, avec les pattes en partie foncées.

Le **C. notatipes** n. sp., du Congo, est très voisin, il a le sommet des tibias et les tarses noirs et pas de macule humérale noire.

Le **C. ivoirensis** n. sp., de la Côte d'Ivoire, a le dessous du corps en partie foncé, les cuisses en partie noires. Peut-être variété du précédent.

C. Pouilloni n. sp. du Dahomey, est roux, le labre

est maculé de noir d'ordinaire et le prothorax est bimaculé de noir. Peut-être variété de *simplex* Suf.

C. Bruyanti n. sp. Oblongus, nitidus, infra niger, supra rufo testaceus et nigro notatus, thorace nigro bimaculato, elytris antice et postice nigro fasciatis, sutura pro parte nigra, scutello nigro. Long. 3-3,5 mill. Congo. — A placer près de *anchorago* Suf., en diffère par la suture non largement noire antérieurement.

C. binotaticeps n. sp. Subovatus, parum nitidus, infra niger, supra luteo-testaceus, nigro maculatus, antennis ad basin pedibusque testaceis, scutello flavo, nigro marginato, capite thoraceque nigro bimaculatis, illo fortiter punctato; elytris ad basin et ad suturam nigro marginatis, antice et ad medium late nigro maculatis, fortiter lineato-punctatis. Long. 4 mill. Sénégal. — Voisin de *atropygidialis* Pic, mais prothorax bimaculé et élytres à dessins bien différents avec une large macule basale et une large macule postmédiane communes noires.

C. diversesuturalis n. sp. Subovatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis apice piceis, élytris in disco et antice late nigro maculato-sinuatis; thorace fere læve; elytris lineato-punctatis. Long. 4 mill. Dahomey. — Voisin du précédent, avec une autre coloration et le dessus moins fortement ponctué. Le dessin des élytres rappelle celui de *C. Lowei* Suf.

C. Martini n. sp. Oblongus, rufus, capite postice, pectore elytrisque nigris, his apice vage rufo notatis; thorace distincte punctato; elytris minute lineato-punctatis, apice impressis. Long. 3 mill. Port Elisabeth. — Peut se placer près de *Dregei* Suf., en diffère par la coloration bicolore de la tête, le prothorax immaculé, etc.

Anteriscus rufosuturalis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, elytris antice in disco et lateraliter late nigris; thorace fere leve; elytris minute lineato-punctatis.

Long. 4 mill. Gabon. — Peut se placer près de *Holdhausi* Rein., coloration élytrale différente et particulière dans le genre.

A. externeprolongatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, antennis apice nigris, elytris ad basin nigro sinuato-fasciatis (fascia lateraliter postice prolongata) et postice in disco late nigro maculatis. Long. 4-4,3 mill. Gabon. — Voisin du précédent, mais dessins des élytres différents. Parfois le pygidium et le dessous du corps s'obscurcissent.

A. subdislocatus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris ante apicem multi et irregulariter nigro-maculatis, elytris ad basin nigro-marginatis, mediocre sat irregulariter lineato-punctatis. Long. 9 mill. Afrique occidentale. — Espèce très distincte par sa forme jointe à ses dessins élytraux.

A. sublatefasciatus n. sp. Oblongus, rufus, elytris postice late nigro fasciatis, his sat fortiter lineato-punctatis. Long. 8 mill. Indes. — Voisin du précédent.

Dioryctus humeralis n. sp. Subovatus, latus, rufus, infra corpore pro parte nigro, elytris ad humeros late nigro notatis, sutura nigra; thorace parum punctato; elytris minute lineato-punctatis. Long. 3 mill. Yunnan. — Voisin de *maculatus* W., très distinct par le prothorax non taché de noir à la base et le dessin des élytres.

D. annulatus n. sp., de la même provenance, est très voisin, le dessous du corps est roux, et les élytres offrent une grande lunule extérieure noire, laissant leur milieu roux.

D. testaceipes n. sp. Subovatus, latus, niger, capite, thorace membrisque testaceis; thorace distincte punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis. Long. 2 mill. Japon. — A placer près de *variabilis* Jac.

Bruchus breveapicalis n. sp. Oblongus, ovatus, luteo pubescens, rufus, antice pro parte brunnescens, antennis latis, ad medium nigris; thorace breve, antice valde attenuato; elytris thorace paulo latioribus, striatis, rufis, apice breve piceo notatis; pygidio dense luteo pubescente. Long. 4 mill. Trinitad. — Peut se placer près de *tonkineus* Pic.

B. rugulosus n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, subopacus, supra pro parte et infra griseo-pubescens, niger; antennis brevibus, filiformibus; thorace satis elongato, obconico, dense punctato-ruguloso; elytris thorace non latioribus, parum elongatis, ad suturam excavatis, distincte striatis, intervallis punctatis; pedibus posticis validis. Long. 4 mill. Mindanao (ex Baker). — Peut se placer près de *indicus* Pic, dont il diffère par le prothorax plus robuste, les élytres pas plus larges que lui.

B. celebensis n. sp. Oblongus, antice attenuatus, dense luteo pubescens, rufescens, capite, scutello, infra corpore pro parte, elytris ad suturam et ad humeros nigris, pygidio membrisque testaceis; antennis satis elongatis; thorace parum breve, antice subarcuato, dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, minute striatis. Long. 4 mill. Célèbes. — A placer près de *Lherminieri* F.

Callosobruchus sulcaticollis n. sp. Oblongus, griseo-pro parte sat dense pubescens, rufus, capite pro parte et pectore nigris, thorace elytrisque nigro maculatis; thorace antice valde attenuato, in disco sulcato; elytris thorace valde latioribus, parum striatis; pygidio dense pubescente; femoribus posticis tridentatis. Long. 4 mill. Afrique Orientale. — Peut se placer près de *rhodesianus* Pic.

C. pulcher n. sp. Oblongus, opacus, niger, capite, thorace et femoribus posticis rufo-notatis, antennis et pedibus 4 anticis rufis; antennis elongatis, dentatis; thorace antice valde attenuato, nigro aut rufo varie-

gato, postice fortiter bicalloso; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, striatis, disperse griseo-maculatis aut breve lineolatis, ad suturam antice luteo notatis; pygidio dense albo notato. Long. 3 mill. Luzon (ex Baker). — A placer près de *Maindroni* Pic.

Spermophagus diversipes n. sp. Subovatus, luteo pubescens, niger, femoribus 4 anticis et spinis posticis rufis, elytris lineato-punctatis. Long. 4 mill. Penang (ex Baker). — Voisin de *Kannegieteri* Pic, moins robuste, avec les pattes non entièrement foncées.

S. Simoni v. nov. immaculatus. Subovatus, niger, supra immaculatus sed fere uniformiter griseo aut luteo pubescens. Palawan (ex Baker). — La forme type a les élytres ornés de macules grises.

S. testaceus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus; thorace breve, diverse punctato; elytris thorace non latioribus, sat fortiter striato-punctatis; pygidio testaceo, sparse punctato. Long. 7 mill. Trinitad. — A placer près de *subflavidus* Pic.

Morphozonitis n. gen. Corpus robustus, capite mediocre rostrato; palpis brevibus; thorace subgloboso; elytris lateraliter impresso sulcatis; pedibus validis, unguibus non pectinatis.— Genre voisin de *Zonitodema* Pering, dont il se distingue, à première vue, par la structure des ongles.

Morphozonitis atripennis n. sp. Fere opacus, dense punctatus, breve hirsutus, rufus, articulo 2° antennarum majore parte, tibiis, tarsis elytrisque nigris. Long. 18 mill. Transvaal.

Nemognatha angolensis v. nov. Crampeli. Niger, capite rufo notato, thorace, scutello elytrisque testaceis, his apice nigro notatis; thorace lato, antice dilatato, mediocre punctato, biimpresso. Congo.

Apalus (Sitaris) atricornis n. sp. Robustus, nitidus, rufus, antennis et elytris apice breve nigris; capite

thoraceque fortiter et sparse punctatis; elytris valde dehiscentibus et postice valde reductis. Long. 12 mill. Indes orientales. — Peut se placer près de *rnfipes* Gory.

Zabriola obscurifrons v. nov. Sikorai. Membris plus minusve testaceis, elytris testaceis, ad basin nigro notatis. Madagascar.

Z. annulicornis n. sp. Angustatus, fere opacus, testaceus, articulis antennarum 3 et sequentibus apice plus minusve nigris, tibiis tarsisque brunnescentibus aut piceis. Long. 9 mill. Madagascar. — Distinct, à première vue, de *fuscipennis* Frm., par les antennes annelées.

Sessinia (1) **testaceicornis** n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, elytris apice breve nigro notatis. Long. 10 mill. Tanganika. — Distinct, à première vue, de *atroapicalis* Pic, par la coloration entièrement testacée des membres et le prothorax sillonné au milieu.

S. bicoloripes n. sp. Elongatus, paulo nitidus, testaceus, antennis, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris; thorace diverse impresso, minute punctato; elytris minute punctatis. Long. 10 mill. San Thomé. — Forme du précédent, prothorax non sillonné sur le disque, élytres concolores.

S. victoris n. sp., du Cameroun, est très voisin du précédent, coloration analogue, mais avec les cuisses entièrement testacées.

S. Poulloni n. sp. Parum robustus, nitidus, holosericeo pubescens, testaceus, antennis apice brunnescentibus; thorace robusto, dense punctato, in disco triimpresso; elytris, thorace valde latioribus, satis brevibus, postice attenuatis, minute punctatis. Long. 10 mill. Dahomey. — A placer près de *helvola* Klug.

(1) On peut grouper les espèces d'Afrique, à forme plus ou moins étroite et tarses assez grêles, comme *striola* Frm., dans un sous-genre nouveau, que je nomme **Oxacosessinia.**

Le **S. lateritincta** Frm., du Gabon (coll. Pic ex Aubert), que je crois in litteris, a la forme et le faciès du précédent, mais il offre, sur les côtés des élytres, une bande longitudinale obscure.

Microsessinia n. gen. Robustus et satis brevis; articulo ultimo palparum parum elongato; oculis thorace paulo distantibus; thorace valde impresso; tibiis anticis apice breve mucronatis, tarsis satis gracilibus. — A placer près de *Sessinia* Pascoe.

Microsessinia cyanescens n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, nitidus, pro parte sericeo pubescens, nigro-cœrulescens, capite thoraceque robustis, illo fortiter impresso, sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, minute et dense punctatis. Long. 8 mill. Côte d'Ivoire et Gabon.

M. notatipennis n. sp. Subparallelus, nitidus, holosericeo pubescens, nigro-subænescens, elytris ad humeros testaceo notatis, antennis ad basin tibiisque pro parte rufis. Long. 7 mill. Gabon. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par la forme subparallèle, le prothorax moins largement et plus profondément impressionné sur le disque.

Asclera atricolor n. sp. Angustatus, subparallelus, parum nitidus, ater; thorace satis elongato, postice strangulato, in disco mediocre impresso; elytris thorace satis latioribus, elongatis, parallelis, dense punctatis, minute costatis. Long. 7-8 mill. Madagascar. — Diffère à première vue de *tenuecostata* Frm. par sa coloration entièrement foncée.

Nacerda subacuminata n. sp. Angustatus, postice attenuatus, parum nitidus, testaceus; thorace parum breve, in disco late impresso, dense punctato; elytris thorace satis latioribus, minute et sat dense punctatis, subcostatis. Long. 13 mill. Madagascar. — Espèce très distincte par sa forme.

? Nacerda latenigra n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque ad basin late rufo-testaceis; capite lato, satis rostrato; thorace parum breve, modice impresso, postice valde marginato, minute punctato; elytris thorace parum latioribus, minute punctatis, sutura elevata. Long. 7-8 mill. Benguela. — Cette espèce se distingue de tous les *Oedemerides* d'Afrique à antennes non comprimées par les élytres largement noirs au sommet.

Bolitonaeus longedentatus n. sp. Oblongus, niger, capite ♂ antice et breve laminato, simplice ♀ ; thorace transverso, dense punctato, ♂ antice et lateraliter longe sinuato cornuto, ♀ simplice; elytris costis interruptis munitis, intervallis pro parte et minute foveolatis. Long. 3,5 mill. Sumatra. — Voisin de *mergæ* Lev., ♂ cornes du prothorax plus longues, tête munie d'une lamelle bien détachée quoique courte.

Une espèce nouvelle voisine (**niasensis**), de Nias, est roussâtre, plus trapue, les intervalles des élytres sont plus nettement fovéolés et les cornes du ♂ sont plus courtes.

Une autre voisine, de la même origine (**brevedentatus**) a les dents du prothorax ♂ courtes et droites, tandis que la lamelle de la tête, très courte, est trifide.

Enfin, une 3e espèce, de Nias (**laminatus**), est noire, avec les membres roux, ayant le prothorax en partie fortement granuleux et la tête munie, chez ♂, d'une très longue et mince lamelle.

B. simpliciceps n. sp. Oblongus, niger, antennis pedibusque rufis; capite simplice ♂ ; thorace transverso, antice breve et bicornuto ♂, simplice ♀, sparse granulato; elytris lineato-tuberculatis, intervallis pro parte granulatis. Long. 4 mill. Bornéo. — Plus robuste que *longedentatus* mihi avec la tête simple chez ♂, etc.

B. bicornutus n. sp. Oblongus, nigro-piceus, membris rufis, ♂ capite antice breve bicornuto, simplice ♀ ; thorace transverso, sparse granulato, ♂ antice sat breve

arcuato bicornuto, simplice ♀ ; elytris costis interruptis munitis, intervallis pro parte et minute granulatis. Long. 3 mill. Tonkin. — La tête bicornée du ♂ distingue, à première vue, cette espèce des précédentes.

B. truncatus n. sp. Robustus, nigro-piceus, antennis pedibusque rufis; capite simplice; thorace transverso, in medio depresso, antice in medio late truncato, pro parte punctato, pro parte ruguloso-tuberculato; elytris subcostatis, intervallis punctatis et plicatis. Long. 3 mill. Nias. — Caractérisé par la structure particulière du prothorax.

B. robustus n. sp. Oblongus, robustus, niger, membris rufescentibus, supra pro parte granulatus; capite ♂ antice lato et breve laminato, ♀ simplice; thorace ♂ antice et lateraliter breve et truncato cornuto, ♀ simplice; elytris lineato-granulatis, intervallis pro parte et minute foveolatis. Long. 5 mill. Mentawei. — Très distinct par sa forme robuste et la structure de l'avant-corps.

Pentaphyllus borneensis n. sp. Oblongus, glaber, piceus, membris rufis, capite ad oculos in mare breve tuberculato. Long. 3 mill. Bornéo. — Voisin de *biconiger* Geb., dont il se distingue, à première vue, par le corps glabre.

P. notatus n. sp. Robustus, subovatus, glaber, capite antice, antennis pro parte pedibusque testaceis, elytris antice et postice testaceo notatis; capite in mare bicornuto; elytris irregulariter punctatis; thorace valde ransverso, lateraliter arcuato. Long. 2-2,5 mill. Mentawei. — A placer près de *biconiger* Geb.

P. concolor n. sp. Oblongus, rufo-testaceus, minute sat dense punctatus; capite ad oculos subgibboso; thorace transverso, lateraliter paulo subarcuato; elytris brevibus, postice breve attenuatis. Long. 3 mill. Mentawei. — En outre de la coloration, diffère du précédent par le prothorax à peine arqué latéralement.

Cyclonesus Dohertyi n. sp. Subovatus, cyaneus, elytris latis, æneis et purpureo lineato-striatis, apice submucronatis. Long. 10 mill. Malacca. — Semble différer de *parvicollis* Frm. par la coloration des élytres, ces organes présentant des lignes pourprées étroites (sur les stries fines); les élytres sont un peu plus larges que le prothorax à la base et terminés par un mucron très réduit et émoussé.

C. mucronatus n. sp. Subovatus, membris et infra corpore cyaneis, supra plus minusve æneus aut, in elytris, æneo-cupreus et viridi-striatus; elytris latis, apice distincte mucronatis. Long. 10 mill. Bornéo. — Diffère du précédent par les élytres nettement mucronés et de coloration différente.

C. viridipennis n. sp. Subovatus, membris et infra corpore cyaneis, supra plus minusve æneus aut virides-cens, elytris striato-purpureis et lateraliter aliquot purpureo marginatis, apice indistincte mucronatis et antice thorace non latioribus. Long. 8 mill. Bornéo. — Distinct, à première vue, des précédents par les élytres moins larges, plus étroits à la base, les angles huméraux étant à la hauteur des angles postérieurs du prothorax.

Steneucyrtus forticornis n. sp. Elongatus, nitidus, piceus, infra pro parte rufescens, supra æneo-virides-cens, membris et elytris lateraliter viridi-cyanes-centibus; antennis satis validis; thorace postice deplanato; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Semble différer de *pexicollis* Frm., en outre de la coloration, par les antennes plus robustes.

Agymnonyx rufimembris n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra late viridescens, elytris ad suturam et ad medium violaceis, ad humeros cupreo notatis, his minute striatis et fortiter lineato punctatis, membris rufis; thorace lateraliter subundulato, angulis anticis

valde prominulis. Long. 12 mill. N^lle-Guinée. — Peut se placer près de *brevipes* Geb.

A. cyaneus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra cœrulescens, antennis ad basin, femoribus ad basin et infra corpore pro parte rufescentibus. Long. 12 mill. Batjian. — Voisin de *rugipennis* Geb., distinct par le prothorax presque droit en avant, à angles antérieurs non avancés.

Hemicera pulchra n. sp. Subovatus, cyaneus, violaceo mixtus, thorace cupreo maculato, elytris cyaneis, aureo et cupreo lunulatis, antice et postice violaceo maculatis, sutura multicolor; elytris minute striatis, sat convexis, apice parum attenuatis. Long. 14-15 mill. Ile Nias. — A placer près de *zigzaga* Mars.

H. grandis n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo dilatatus, æneo-cupreus, scutello, infra et pedibus viridibus, antennis nigris; elytris striatis; thorace minute et sparse punctato. Long. 18 mill. Java. — A placer près de *purpurina* Frm.

H. laosensis n. sp. Oblongo-elongatus, niger, capite thoraceque vage aurichalceis, elytris aeneis, striatis, striis purpureo marginatis. Long. 16 mill. Laos. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax à peine ponctué et un peu alutacé et les stries des élytres plus fines.

H. picea n. sp. Oblongo-elongatus, piceus, infra corpore pedibusque pro parte rufis; thorace inæquale, minute et sparse punctato; elytris striatis. Long. 11 mill. Iles Philippines. — Espèce distincte, à première vue, par sa coloration; voisine des précédentes.

H. seminigra n. sp. Oblongus, niger, pedibus vage viridescentibus, elytris aeneo-cupreis, sat fortiter striato-punctatis; thorace minute et sparse punctato. Long. 16 mill. Java. — A placer près de *semicyanea* Kr.

H. diversipes n. sp. Oblongus, cupreo-violaceus, ely-

tris æneis, striatis; thorace parum et fere indistincte punctato; femoribus et tarsis sinuatis et curvatis, pro parte luteo pilosis, tarsis longe pilosis. Long. 22 mill. Banguey. — Espèce très distincte par la structure de ses pattes, se rapprochant, par là, de *pilipes* Frm.

H. purpureocincta n. sp. Oblongo-elongatus, pro parte viridescens, supra aeneo-cupreus, elytris viridibus, striis purpureis munitis, purpureo cinctis, his striatis et lateraliter subgibbosis; thorace breve, postice impresso, parum et sparse punctato; tibiis apice fulvo pubescentibus. Long. 6 mill. ?Bornéo. — Peut se placer près de *laticollis* Frm.

Platycrepis tonkineus n. sp. Oblongus, niger, capite et pedibus vage viridescentibus, elytris violaceo-cupreis, lateraliter viridi cinctis, striis viridibus; thorace fere impunctato, postice arcuate impresso. Long. 17 mill. Tonkin. — A placer près de *viridicinctus* Frm.

P. elongatus n. sp. Elongatus, postice parum dilatatus, nitidus, cœruleus, elytris purpureis; thorace fere impunctato, postice impresso; elytris elongatis, striatis, striis fere impunctatis. Long. 8 mill. Java. — Espèce très distincte par sa forme allongée jointe à sa coloration.

P. minutissimus n. sp. Oblongus, postice dilatatus, cœruleus, elytris cupreo-purpureis, ad humeros et postice viridi-violaceo notatis, infra corpore rufo. Long. 7 mill. Java. — Voisin du précédent par sa coloration, mais forme plus raccourcie, tibias intermédiaires, non arqués, etc.

P. curticollis n. sp. Oblongus, postice dilatatus, nigro-cyaneus, elytris viridibus, lateraliter cupreo marginatis; thorace breve, fortiter marginato, postice arcuato-impresso, parum fortiter et sparse punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis. Long. 13 mill. Célèbes. — Peut se placer près de *violaceus* Kr.

Gauromaia viridipennis n. sp. Parum elongatus, niger, capite thoraceque viridibus, violaceo aut cupreo tinctis; elytris viridibus, lateraliter purpureo tinctis, substriatis, lineis sat fortiter punctatis. Long. 17 mill. Java. — A placer près de *Hasselti* Frm.

G. medanensis n. sp. Coloration analogue au précédent, avec les pattes vertes, mais plus étroit, élytres plus convexes, tête plus fortement ponctuée, prothorax moins large et nettement rétréci en avant. Long. 13 mill. Sumatra.

G. javana n. sp. Oblongus, niger, elytris violaceo-purpureis, femoribus pro parte rufis. Long. 16-17 mill. Java. — A placer près de *diversipes* Frm.

G. robusta n. sp. Oblongus, viridi-cœruleus, thorace lateraliter arcuate purpureo lineato, femoribus pro parte rufis; thorace transverso, minute et sparse punctato; elytris minute striatis, striis mediocre punctatis, his pro parte purpureis, sutura vage cœrulea. Long. 15-17 mill. Kina-Balu. — A placer près de *suturata* Frm.

G. niasensis n. sp. Satis elongatus, viridis, antennis ad basin pedibusque pro parte rufis, elytris violaceo-purpureis, ad suturam et lateraliter viridibus; thorace breve, convexo, fortiter punctato; elytris striato-punctatis. Long. 8 mill. Ile Nias. — A placer près de *semicyanea* Frm.

G. variicolor n. sp. Satis elongatus, cyaneus, elytris æneis, ad basin late cyaneo aut purpureo et apice breve cyaneo-purpureo notatis. Long. 10 mill. Bornéo. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax moins transversal et par les élytres plus fortement ponctués.

G. semiopaca n. sp. Elongatus, niger, pedibus vage viridibus, supra nigrocuprescens, thorace elytrisque testaceis, illis minute lineato-punctatis, fere instriatis.

Long. 12 mill. Java. — Voisin du précédent, bien distinct par le prothorax et les élytres subopaques.

Camarimaena Rouyeri n. sp. Elongatus, nigro-subæneus; thorace parum lato, fortiter et dense punctato; elytris minute striato-punctatis. Long. 10-11 mill. Java. — Voisin de *brevicollis* Frm., plus étroit, prothorax moins large, etc.

C. crassiferum n. sp. Oblongo-elongatus, aeneo-viridescens, infra corpore femoribusque pro parte rufescentibus (forma typica), aliquot pedibus rufis, tarsis cœruleis (v. nov. **cyaneitarsis**); thorace fortiter et sparse punctato; elytris minute striato-punctatis; femoribus crassis. Long. 13 mill. Sumatra, Bornéo. — Très distinct du précédent par les cuisses très épaisses et la ponctuation écartée du prothorax.

Calydonis maroniensis n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, nitidus, aeneus; antennis brevibus, apice mediocre dilatatis; capite parum lato, punctato, oculis mediocribus; thorace transverso, marginato, lateraliter fere recto, minute et sparse punctato; elytris subconvexis, minute striato-punctatis, interstitiis deplanatis; pedibus brevibus, tibiis anticis arcuatis. Long. 17 mill. Guyane française. — Voisin de *cuprea* Pasc.

Camariomorpha particularipes n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, piceo aut viridi-aenescens; thorace sparse punctato; elytris striatis, apice dentatis; pedibus validis, tibiis anticis sinuatis, intermediis apice valde dilatatis, posticis subsinuatis. Long. 23 mill. Java. — A placer près de *javana* Pic.

Robustocamaria n. gen. Metasterno antice tuberculato; femoribus valde claviformibus; elytris inspinosis (type du genre *C. fortipes* Pic). — A placer près du genre *Camariomorpha* Pic.

Camaria lineata (Chevr.). Elongatus, viridi-metalli-

cus; elytris inæqualibus, apice breve spinosis, minute et purpureo lineato-punctatis, intervallis deplanatis, viridibus, medio purpureo lineatis. Long. 17 mill. Caracas. — Voisin de *singularis* Pic et aussi de *lævis* Geb.

C. viridilineata n. sp. Elongatus, niger, elytris viridibus, minute purpureo lineatis et lineato punctatis, postice lateraliter multi impressis. Long. 18 mill. Brésil. — Ressemble au précédent, mais élytres non épineux à l'extrémité et interstries concolores.

Très voisin du précédent est la **multiimpressa,** du Brésil, qui a les élytres multiimpressionnés sur les côtés, presque depuis la base, l'avant-corps et le dessous à reflets bronzés.

C. lineatopunctata n. sp. Oblongus, viridis et cupreus, elytris subaeneis, minute purpureo lineatis et lineato punctatis. Long. 12 mill. Bresil. — En outre de la forme plus trapue se distingue du précédent par l'avant-corps et le dessous à colorations mélangées verte et pourprée.

C. bicoloripennis n. sp. Oblongo-elongatus, aeneus, elytris pro parte viridibus, pro parte purpureis et purpureo lineato punctatis, his lateraliter et apice multiimpressis aut plicatis. Long. 14 mill. Brésil. — Très voisin de *boliviensis* Pic, avec le prothorax plus fortement ponctué et les élytres à interstries verts mélangés de pourpré.

La var. nov. **viridialternata,** du Brésil, se distingue, à première vue, par sa rangée de points disposée sur une ligne étroite verte au lieu d'être pourprée.

C. subangulicollis n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, aeneus, elytris lineato-punctatis, interstitiis deplanatis; thorace lateraliter subangulato-dilatato. Long. 25 mill. Bolivie. — Voisin de *punctulata* Pic très distinct par la forme de son prothorax et les élytres plus élargis en arrière.

C. bicoloripes n. sp. Oblongus, viridescens, pedibus

rufis, femoribus apice metallicis; elytris lineato-punctatis, interstitiis deplanatis, ad basin breve impressis, postice et lateraliter multi impressis aut plicatis. Long. 16 mill. Parana. — A placer près de *paranana* Pic.

C. ruficolor n. sp. Elongatus, supra rufus, subopacus, infra rufus, pro parte viridescens et nitidus; elytris striatis; thorace lateraliter subangulato-dilatato. Long. 20 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa coloration, son dessus mat et le dessous un peu brillant métallique.

C. immaculata n. sp. Elongatus, nitidus, viridescens, elytris rufo-testaceis, striatis, infra pro parte rufescens. Long. 13 mill. Brésil. — Voisin de *rufipennis* Pic, plus étroit, avec les élytres non maculés de brun.

Deux espèces brésiliennes nouvelles, très voisines de cette dernière, sont: l'une (**Leseleuci**) bronzée en dessus avec les élytres teintés de roussâtre, ayant les stries largement ponctués; l'autre (**striatipennis**) plus petite, verdâtre, a les élytres assez fortement ponctués et le prothorax moins fortement ponctué.

C. bogotensis n. sp. Elongatus, nitidus, postice minute dilatatus, aeneus, pro parte rufescens, elytris striatis; thorace postice parum dilatato, lateraliter sinuato, antice valde attenuato. Long. 24 mill. Bogota. — Espèce très distincte par la forme du prothorax.

Truncatocamaria s. g. Epipleuris apice dilatatis, elytris apice intus truncatis et angulatis. Pour *C. spinifer* Pic et sp. près.

Xenostethus caudatus n. sp. Elongatus, niger, elytris viridi-metallicis, antennis apice rufis; thorace fortiter et sparse punctato; elytris elongatis, punctato-striatis, apice breve subrotundato-caudatis. Long. 17 mill. Sierra Leone. — Voisin de *C. Mocquerysi* Pic, très distinct par la particulière terminaison des élytres.

X. angustatus n. sp. ♂ Angustatus, niger, elytris purpureis, antennis, articulo 1° nigro excepto, tibiis anticis tarsisque testaceis, tibiis anticis intus triangulariter dentatis, posticis intus sinuatis. Long. 11 mill. Gabon. — Espèce très distincte par sa forme étroite jointe à la structure des pattes.

Heterogria longicornis n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, parum hirsutus, testaceus, capite thoraceque rufis, illo dense punctato; antennis elongatis, apice nigris; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis diverse punctatis. Long. 5 mill. Indes Mér. — Moins foncé que *punctatissima* Frm., avec la structure élytrale différente.

H. lata n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, glaber, testaceus, antennis apice nigris; thorace transverso, fortiter et sparse punctato, lateraliter arcuato; elytris latis et satis brevibus, mediocre striato-punctatis, intervallis parum et minute punctatis. Long. 5 mill. Indes Mér. — Plus large que le précédent, avec le prothorax un peu arqué sur les côtés et plus fortement ponctué.

H. annamita n. sp. ♀ Très voisin du précédent, moins robuste, avec les élytres plus fortement striéponctués, le prothorax moins large, plus fortement ponctué, les antennes plus grosses et plus largement noires. Long. 5 mill. Annam.

H. laticeps n. sp. ♀ Voisin des précédents et distinct, à première vue, par sa tête, très robuste, presque aussi large que le prothorax, la coloration foncée du dessous et le sommet des cuisses rembrunis. Long. 6 mill. Tonkin.

H. testaceipes n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, rufus, pedibus pallidioribus, antennis apice nigris, articulo ultimo elongato; elytris fortiter striato punctatis. Long. 4,5 mill. Iles Philippines. — Voisin de *longipilis* Pic, prothorax moins transversal et plus

fortement ponctué, élytres plus fortement ponctués avec les intervalles étroits.

H. curticornis n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, sparse hirsutus, rufo-testaceus, antennis apice nigris; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis fortiter punctatis. Long. 5 mill. Java. —Très distinct de *longipilis* Pic par les antennes plus courtes et la sculpture élytrale.

H. atricornis n. sp. ♀ Elongatus, nitidus, glaber, niger aut piceus, thorace elytrisque brunnescentibus; capite foveolato; elytris elongatis, lateraliter sinuatis, ad basin depressis, mediocre striato-punctatis. Long. 5 mill. Gabon. — Voisin de *P. striatella* Gylh., forme et coloration différentes.

H. testaceicornis n. sp. ♀ Parum elongatus, nitidus, parum pubescens, testaceus, membris pallidioribus; antennis elongatis; thorace subquadrato, fortiter et dense punctato; elytris elongatis, striato-punctatis et pro parte plicatis. Long. 6 mill. Ceylan. — Peut se placer près de *oculata* Frm.

Le **H. ceylonica** mihi, de Ceylan, est moins testacé, en partie roussâtre, densément pubescent de gris, avec une ponctuation plus dense sur l'avant-corps et les antennes un peu rembrunies au sommet.

H. atripennis n. sp. ♀ Oblongus, robustus, parum nitidus, pubescens, niger, antennis ad basin, thorace pedibusque rufis. Long. 6 mill. Palawan. — Espèce très distincte par sa coloration.

Lagriocera rufipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, niger, elytris cœrulescentibus, antennis ad basin, thorace pedibusque rufis, capite brunnescente. Long. 5 mill. Java. — Diffère de *sumatrensis* Pic, en outre de la coloration plus claire des pattes, par le dernier article des antennes plus long.

Adynata pubescens n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, dis-

tincte pubescens, testaceus, antennis apice brunnescentibus, articulo ultimo satis breve; thorace transverso, antice dilatato; elytris sat fortiter striato-punctatis. Long. 5 mill. Zanguebar. — A placer près de *brevicollis* F., en diffère par les pattes testacées, la pubescence couchée, etc.

A. Crampeli n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, rufescens, antennis, capite postice, infra corpore pro parte pedibusque nigris, femoribus ad basin rufis; articulo ultimo antennarum longe; thorace subquadrato; elytris modice striatis et pro parte plicatis. Long. 5,5 mill. Congo. — Plus allongé que le précédent, avec de longs poils dressés, etc.

A. ocularis n. sp. ♂ Très voisin du précédent, mais yeux plus grands et gris, antennes à dernier article plus court et subsinué, dessus paraissant glabre. Long. 6 mill. Congo.

A. crassicornis n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, testaceus, oculis et antennis apice late nigris, his crassis, articulo ultimo elongato, infra impresso. Long. 5,5 mill. Gabon. — Espèce remarquable par ses grosses antennes, à dernier article impressionné en dessous et, par ce dernier caractère, se rapprochant un peu de *Lagriocera* Frm.

Cerogria semimetallica n. sp. ♂ Elongatus, nitidus, niger, piceus, elytris cupreo-purpureis; capite satis robusto, dense punctato, oculis fortiter incisis; antennis elongatis, articulo 4° arcuato, 6° dilatato et dentato, 9° paulo dilatato, ultimo longissimo; thorace parum elongato, dense punctato; elytris thorace valde latioribus, dense ruguloso-punctatis. Long. 7 mill. Madagascar. — Espèce très distincte, entre toutes, par sa coloration jointe à la structure antennaire.

C. didyana n. sp. ♂ Oblongo-elongatus, dense punctatus, rufo-testaceus, antennis apice pedibusque piceis, femoribus ad basin rufis; capite thorace satis latiore,

oculis paulo incisis; antennis elongatis, articulo 3° elongato, 4° apice dilatato, 6°, 9° majoribus, intus dentatis; thorace elongato; elytris thorace valde latioribus, satis elongatis. Long. 7 mill. Madagascar. — Voisin de *tenuicollis* Frm. 3e article des antennes plus long par rapport au 2e, coloration des pattes différente, etc.

Le **C. particularis** n. sp., de la même origine, très voisin, a les antennes filiformes, longues et minces, testacées avec le dernier article foncé, le 4e article long a la forme du 3e, le prothorax est moins densément ponctué, nettement impressionné et subcaréné au milieu postérieurement, enfin les pattes sont plus claires, roussâtres, les cuisses étant en partie plus claires.

C. singularicornis n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, fortiter pro parte sparse punctatus, testaceus, antennis apice, pedibus apice tibiisque ad basin nigris; capite satis robusto; antennis satis elongatis, articulo 4° valde curvato, 6°, 9° majoribus, intus valde dentatis, ultimo longissimo; thorace satis breve, lateraliter subarcuato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, ad basin fortiter impressis. Long. 5 mill. Madagascar. — A placer près de *insignicornis* Frm.

Lagria subacuminata n. sp. Ovalis, amplus, rufotestaceus, capite postice, thorace in disco late membrisque piceis aut nigris, femoribus ad basin late testaceis; antennis sat elongatis, articulis penultimis transversis, articulo ultimo elongato; thorace satis angustato, lateraliter sinuato, densissime punctato-ruguloso; elytris thorace valde latioribus, apice subacuminatis, humeris rotundatis, irregulariter punctatis. Long. 14 mill. Madagascar. — A placer près de *hydropica* Frm.

L. rufolimbata n. sp. Ovalis, amplus, piceus, capite thoraceque rufescentibus, illo lateraliter piceo notato, scutello rufo, elytris piceis, rufo limbatis. Long. 14 mill. Madagascar. — Diffère de *hydropica* Frm., en

outre de la coloration du dessus, par les pattes entièrement foncées, le prothorax à angles antérieurs saillants en dehors, etc.

La **L. subampla** n. sp., de Madagascar, très voisine de cette dernière, a les élytres testacés et peu rétrécis postérieurement, la base des cuisses plus ou moins teintée de roux et le dernier article des antennes, chez ♀, plus épais. Cette espèce fait le passage entre les précédentes nouveautés et *ampla* Frm.

L. suturalis n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, rufescens, antennis apice abdomineque pro parte nigris, elytris testaceis, late piceo bilineatis. Long. 8 mill. Madagascar. — De coloration, rappelle *vittulata* Frm., mais plus robuste, avant-corps de coloration rousse et fortement ponctué, etc.

L. subvittulata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, breve pubescens, rufus, thorace in disco, infra corpore pedibusque pro parte obscurioribus, antennis nigris, ad basin testaceis, apice dilatatis; elytris rufo-brunneis, testaceo cinctis et in disco parum distincte lineato testaceis. Long. 5 mill. Madagascar. — A placer près de *vittulata* Frm.

L. testaceotincta n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, piceo-castaneus, capite antice, antennis ad basin pedibusque pro parte rufo-testaceis, thorace elytrisque testaceo-cinctis. Long. 5 mill. Madagascar. — Voisin du précédent, prothorax plus large, antennes plus longues, avec de longs poils soulevés.

Le **Mocquerysi** n. sp., de la même origine, voisin du précédent, a les élytres un peu roussâtres, la tête et le prothorax rougeâtres, ce dernier étant foncé au milieu et les pattes foncées.

TABLE
POUR LE TRENTE-CINQUIÈME FASCICULE

Page

Nouveautés diverses 1